Cognome _____ **Nome** _____

Nato/a il _____ Comune _____

Residente a _____ via _____

tel. _____ Cellulare _____ E-mail _____

Provenienza □ Degente presso il Reparto di _____

□ Esterno

□ *Ricoverato presso altra Struttura _____

*In caso di prestazioni a pazienti ricoverati presso altra Struttura **è necessario** compilare il Modulo di richiesta Prestazioni (M/919/75) ed inviarlo via fax alla Direzione Sanitaria fax 06-33775326. Il modulo è scaricabile dal sito www.ospedalesantandrea.it alla voce moduli on line.

Medico Referente Dr. _____ tel. _____

PER IL MEDICO RICHIEDENTE:

La richiesta dovrà essere presentata con un'unica impegnativa elettronica:

Codice CUR ***92.01.3*** *SCINTIGRAFIA TIROIDEA*

Codice CUR ***92.01.1*** *CAPTAZIONE TIROIDEA*

Codice CUR ***89.01.A*** *VISITA MEDICO NUCLEARE DI CONTROLLO (se ha già eseguito altri esami da noi)*

Codice CUR ***89.7B.3*** *PRIMA VISITA DI MEDICINA NUCLEARE (se non ha mai effettuato altri esami da noi)*

Valutazione della captazione: 3h □ 6h □ 24h □ 48h □

Quesito clinico:_____

_____

Condizioni Generali: □ Autosufficiente □ Sedia a rotelle □ Barella

Notizie anamnestiche: _____

_____

_____

Gravidanza sì □ no □

ECOGRAFIA (data _____**):** _____

_____

FT3 _____ **FT4** _____ **TSH** _____ **Tg** _____ **TRAb** _____

Anti-Tg _____ **Anti-TPO** _____ **Altro** _____

Terapie in corso: _____

Il Medico richiedente (firma e timbro)

Roma lì, _____

_____

Inviare modulo e impegnativa via fax (06-33776614) o via mail (prenotazioni.mednucleare@ospedalesantandrea.it)

PREPARAZIONE CURVA DI CAPTAZIONE CON 131I

Il paziente deve presentarsi munito di impegnativa come indicato sul modulo di richiesta.
Per essere sottoposti all'indagine occorre evitare, **previo consenso del medico prescrivente**, l'assunzione dei farmaci e dei prodotti contenenti iodio o che possano interferire con l'accumulo del radioiodio:

- ✓ 3 mesi prima sospendere farmaci contenenti iodio (Amiodarone).
- ✓ 4 settimane prima non assumere mezzi di contrasto radiografici idrosolubili (TC, uro- e angio-grafie).
- ✓ 20 giorni prima sospendere Tiroxina (Eutirox, Tiche, Tirosint, Levotirsol, ecc.).
- ✓ 15 giorni prima non assumere farmaci espettoranti o soluzioni di Lugol, dentifrici iodati, prodotti a base di alghe marine, prodotti dimagranti contenenti iodio, tinture per capelli, disinfettanti contenenti iodio, lavande vaginali, tintura di iodio.
- ✓ 7 giorni prima sospendere multivitaminici contenenti iodio.
- ✓ 7 giorni prima sospendere Triiodiotiroinina (TiTre, Liotir).
- ✓ 3 giorni prima sospendere il perclorato di potassio (Pertiroid).
- ✓ I farmaci anti tiroidei (Tapazole) vanno sospesi: 20 giorni prima se si è affetti da nodulo tiroideo autonomo o gozzo multinodulare tossico; 5 giorni prima in caso di malattia di Basedow-Graves.
- ✓ La nutrizione parenterale deve essere sospesa 4 ore prima. Quella enterale 6 ore prima.

N.B.: Le donne fertili devono eseguire un dosaggio della β-hGC il giorno prima dell'esame.

E' inoltre fondamentale seguire una dieta che riduca notevolmente l'apporto di iodio. Pertanto nelle due settimane che precedono l'esame occorre evitare sale iodato, pesce di mare, latte e derivati, salumi ed insaccati, alimenti in scatola come tonno, sardine, pane salato.
L'esecuzione della curva di captazione tiroidea si articola in due o tre giornate.
Il primo giorno, presentarsi alle ore 8:30 a **digiuno da 6 ore** presso la UOC di Medicina Nucleare (primo piano seminterrato) muniti di documentazione clinica (ecografia della tiroide o del collo, dosaggi ormonali, precedenti scintigrafie, ecc.). Il paziente verrà informato dal personale circa la possibilità di assumere la colazione. E' necessaria la permanenza di circa cinque ore. Si consiglia di portare con sé una colazione che potrà essere consumata previa autorizzazione del personale.
Il giorno successivo presentarsi nuovamente alle 8:30 per sottoporsi alla prima rilevazione tardiva. Non è necessario il digiuno. E' necessaria la permanenza di circa 1 ora e mezzo.
Il terzo giorno, se prescritto, presentarsi nuovamente alle 8:30 per sottoporsi alla seconda rilevazione tardiva. Non è necessario il digiuno. E' necessaria la permanenza di circa 1 ora e mezzo.
Si consiglia di vestire un abbigliamento comodo e di non indossare gioielli.
Se l'esecuzione dell'indagine è prevista per il periodo estivo portare un capo in più a maniche lunghe (es. giacchino, felpa, ecc.) a causa dell'aria condizionata.

NORME DI RADIOPROTEZIONE PER IL COMPORTAMENTO DOPO L'ESAME

Al termine della procedura occorre evitare contatti ravvicinati e prolungati nel tempo con bambini di età inferiore ai 10 anni e donne in stato di gravidanza, per **24 ore**.
E' consentito pranzare assieme ai familiari, dormire col proprio coniuge.
Non si devono osservare particolari attenzioni per l'uso delle stoviglie, della biancheria, lenzuola e asciugamani (si possono lavare con le altre cose in lavatrice), del bagno.
Non vi sono accortezze particolari da seguire per gli animali domestici.
In caso di gravidanza misconosciuta o allattamento, consultare il medico specialista.